

KASVITAUTIEN TORJUNTA SOKERIJUURIKKAALLA

Juurikkaan lehtiä tuhoavat kasvitaudit ovat *Ramularia*-lehtilaikkutauti, härmä ja ruoste.

Ensimmäiset *Ramularia beticola*-sienen aiheuttamat tautilaikut ilmestyvät juurikkaan lehtiin heinäkuun lopulla - elokuun alkupuolella. *Ramularia*-riski on suuri, jos heinäkuun loppu ja elokuun alku ovat sateisia ja sää on melko lämmin. Tautilaikut ovat ruskeareunaisia, keskeltä harmaita ja epäsäännöllisen muotoisia pyöreitä laikkuja. Kasvusto on ruiskutettava heti ensimmäisten näkyvien oireiden (laikkujen) ilmestyessä kasvustoon ja viimeistään elokuun puolivälissä. Voimakkaassa tautipaineessa ja herkillä lajikkeilla suositellaan uusintaruiskutusta 2–3 viikon kuluttua. Myöhäisissä ruiskutuksissa kannattaa ottaa huomioon valmisteen varoajan pituus.

Härmä (*Erysphire betae*-sieni) ja ruoste (*Uromyces betae*-sieni) voivat esiintyä loppukesästä, jos sää on sateinen ja lämmin sekä on yökastetta. Samat valmisteet on hyväksytty myös härmän ja ruosteen torjuntaan sokerijuurikkaalla.

Lehtitautien torjuntaan hyväksytyt valmisteet:

Comet Pro

- Kertäkäsittely: 0,6-1,2 l/ha
- Jaettu käsittely, 2. ruiskutus 2-3 vk kuluttua: 0,6 l/ha
- Varoaika 30 vrk

Amistar Gold

- Sisältää kahta eri tavalla vaikuttavaa tehoainetta
- Enintään 1,0 l/ha/kasvukausi
- Käyttö 1 kerran/kasvukausi
- Varoaika 35 vrk

Amistar

- Enintään 1,0 l/ha/kasvukausi
- Varoaika 30 vrk
- **HUOM! Amistaria saa käyttää juurikkaalla 26.7.2021 saakka**

Mirador

- Käyttömäärä 0,5-1,0 l/ha
- Varoaika 30 vrk
- **HUOM! Mirador saa käyttää juurikkaalla 23.12.2021 saakka**



Ramularia -pilkkuja juurikkaan lehdissä



Ramularian tuhoaa nopeasti yhteyttävää lehtialaa.



Härmää juurikkaan lehden pinnalla.



Ruoste-sientä juurikkaan lehdellä.