

Ajankohtaista juurikkaan kasvinsuojelussa 6/2018

Juurikaskärpäsen toukan esiintymistä kasvustoissa kannattaa seurata

- Jos uusia juurikaskärpäsen toukan vioituksia havaitaan ylälehdissä, ruiskuta kun toukat ovat kaivautuneet lehtien sisään ja käytävät havaitaan lehdissä.

Typpilannoitus

- Jos olet keväällä päättänyt valita jaetun typpilannoituksen, lisätypen levitys on ajankohtainen kesäkuun lopulla, heinäkuun alussa.
- Jos kevätlannoituksen typpimäärä on jäänyt huomattavasti alle 140 kg/ha, lisätypen antaminen on nyt ajankohtaista.



Rikkakasvien torjunta

- Jos sateen jälkeen maa kostea tai sadetta on luvassa, suositellaan Goltix-/Target-ohjelmaa.
- Jos pellolla on mm. peltosauniota, tattaria, mataraa, rusokkia tai jääntiöljykasveja, suositellaan edelleen Safari-ohjelman käyttöä.
- Juolavehnän torjunta on ajankohtaista. Jätä noin 4–5 välipäivää muihin ruiskutuksiin. Jos juolavehneä on paljon, ruiskutus on syytä uusia viimeistään 3 viikon kuluttua.
- Ohdakkeen ja valvatin onnistuu parhaiten lämpötilan ollessa yli 15 astetta.
- Kuivuuden aiheuttaman pölyämisen takia ruiskutusurissa saattaa kasvaa runsaasti rikkoja. Aja seuraavalla ruiskutuskerralla eri ajourissa tai tee täydennysruiskutus ajojälkien kohdalle.
- Isot savikat, pihatattaret ja peltosauniot ovat vaikeasti torjuttavissa, ja niille suositellaan harausta.
- Rikkakasvi-, Matrigon- ja Cliophar- tai juolavehneäruiskutuksen jälkeen torjunta-aineiden annetaan vaikuttaa vähintään viikko ennen harausta.
- Sunocon tilalla voi käyttää muita kiinnitteitä
 - Renol: 0,25–0,50 l/ha, jos hellesää 0,2–0,3 l/ha
 - Sito Plus: 0,1–0,5 l/ha
 - Farm-kiinnite: 0,1–0,5 l/ha
 - Glyfokem: 0,5 l/ha

Lisätietoja: www.sjt.fi ja www.sucros.fi
