

Saneeraus- ja maanparannuskasvit

Maanparannus- ja saneerauskasvit kuuluvat ympäristösitoumuksen lohkokohtaisiin vapaaehtoiisiin toimenpiteisiin. Saneerauskasvi-/maanparannuskasvikorvauksen ehtona on, että se kylvetään lohkoille, jotka ovat olleet edellisenä vuonna yksivuotisten tuotantokasvien viljelyssä.

Saneerauskasviksi hyväksytään: öljy- ja muokkausretikka (muokkausretiisi), valkosinappi, samettikukka tai näiden seokset.

Maanparannuskasviksi hyväksytään: öljy- ja muokkausretikka, mailaset, ruisvirna, rehuvirna, valkosinappi, mesikät, sikuri, hunajakukka, auringonkukka, kuminan ensimmäisen vuoden kasvusto tai seokset näistä.

Huom! Jos tarkoituksena on alentaa juurikasankeroisen määrää pellolla, niitto/murskaus on ehdoton, sillä se edesauttaa saneerausvaikutusta jatkamalla juurten kasvua ja verson haaroittumista (estää tuleentumisen)

Saneerauskasvien (öljyretikan ja valkosinapin) viljelyohjeet

Öljyretikka ja valkosinappi ovat yksivuotisia kasveja, joita voit käyttää yksinään tai seoksena (sinappia suositellaan käytettävän mieluummin seoksena). Tarkista vakuustodistuksesta, että lajikkeen ankeraisenkestävyys on saneerausluokka I, jolloin ankeroinen ei pysty lisääntymään ja saat parhaan saneeraustehon.

Kylvömäärä 10–25 kg/ha, kylvösyvyys 1 cm. Saneerauskasvia saa lannoittaa nitraatti- ja fosforiasetusten mukaisesti. Jos suunnitelmissa on kasvuston lopetus heti 2 kk minimiajan jälkeen (lyhyempi kasvu-aika) ja lohkoilla on hyvät kasvuolosuhteet, starttilannoitusmäärä riittää.

Kasvuston voi niittää tai murskata kasvukauden aikana. Niitto tai murskaus tehdään noin 20 cm korkeudelta 1–2 kertaa kasvuajasta ja kasvuolosuhteista riippuen. Saneerauskasvi kannattaa niittää ennen kukintaa, sillä se estää siementen muodostumisen. Niitto edesauttaa myös saneerausvaikutusta jatkamalla juurten kasvua ja verson haaroittumista (estää tuleentumisen)

HUOM! Öljyretikkaa ja sinappia ei suositella viljelykiertoon öljykasvien kanssa, sillä ne kaikki ovat möhöjuuren isäntäkasveja.

Monivuotisten rikkakasvien torjunta suositellaan tehtävän viljakierrossa, sillä saneerauskasveille tehtävä niitto ei niitä torju. Myöhästyttämällä kylvöä on mahdollista torjua rikkakasveja pienissä määrin. Myös nopeasti kasvava ja riittävän tiheä saneerauskasvikasvusto voi estää rikkakasvien kasvua varjostamalla niitä.