

Ajankohtaista juurikkaan kasvinsuojelussa 5/2025

Juurikaskärpäsenmunia on havaittu runsaasti. Juolavehnän, peltovalvatin ja -ohdakkeen torjunta ovat ajankohtaisia.

- **Ensimmäisiä juurikaskärpäsen toukan syöntikäytäviä on havaittu.** Tarkkaile munia lehtien alapinnoilta. Toukat kuoriutuvat keskimäärin 4–7 päivän päästä. Jos havaitset lehdistä syöntikäytäviä ja niiden sisällä toukkia, torjunta on ajankohtainen. Torjuntakynnys ylittyy, jos 20 kasvista yli 4 näkyy useampia syöntikäytäviä samassa lehdessä.
- Seuraa tilannetta Tuholaisten seuranta -sovelluksesta (AgriPortal mobile -sovellus tai sucros.fi).
 - Muista ottaa kuvakaappaus puhelimesi ruudun karttanäkymästä todentaaksesi sovelluksen käyttö tukivalvonnassa (Ympäristökorvauksen toimenpide). Lue lisää sovelluksen käytöstä **täältä**.



Tuholaisten kuvat ja torjuntakynnykset löydät täältä.

www.sucros.fi > Juurikkaanviljely > Viljelyohjeet > Kasvinsuojelu

www.sjt.fi > Viljelyohjeet > Kasvinsuojelu > Tuhohyönteiset

Rikkakasvit

- Rikkakasviruiskutukset ovat käynnissä sekä perinteisellä että ConvisoSmart-menetelmällä.
- Jos havaitset ruiskutusten jälkeen rikkakasvilajeja, jotka ovat nyt ”karanneet kasvuun”. Tee **täydennysruiskutus** nopeasti.
 - Täydennysruiskutusohjeet isoille rikkakasveille löydät **Suuret rikkakasvit** -tietokortista.
- Jos perinteisen menetelmän rikkakasviruiskutus ja **juolavehnäntorjunta** ajoittuvat samaan ajankohtaan, tee rikkakasviruiskutus ensin. ConvisoSmart-menetelmällä ei tarvita erillistä juolavehnäntorjuntaa, sillä ConvisoOne tehoaa heinämäisiin rikkakasveihin.
- **Valvatin-/ohdakkeentorjunta** tulee tehdä erillisenä pesäkekäsittelynä tai riviruiskutuksena. Mikäli ConvisoOne-ruiskutus ajoittuu samaan ajankohtaan, huomioi, että ConvisoOne heikentää Matrigonin/Cliopharin tehoa. Sen vuoksi Matrigon/Cliophar on ruiskutettava muutama päivä ennen tai 14 vrk ConvisoOne-ruiskutuksen jälkeen.
 - Juolavehnän, peltovalvatin ja -ohdakkeen torjuntaohjeet löydät **Monivuotisten rikkakasvientorjunta** -tietokortista.

Rikkakasvientorjuntaohjeet löydät täältä.

www.sucros.fi > Juurikkaanviljely > Viljelyohjeet > Kasvinsuojelu

www.sjt.fi > Viljelyohjeet > Kasvinsuojelu > Rikkakasvit

Täydennyslannoitus

- Rakeisen lisätyypen ja lehtilannoitteiden levitys voidaan aloittaa, kun juurikkaalla on noin 6 kasvulehteä tai taimien lehdet koskettavat toisiaan rivillä.
- Mangaanin tai muiden hivenravinteiden ruiskutus on ajankohtainen, mikäli puutos on todennäköinen tai oireet havaittavissa. Useimmat lehtilannoitevalmisteet voidaan laittaa rikkakasvuruiskutuksen kanssa samaan tankkiseokseen.

Lisätietoja ravinnepuutostentunnistamiseen löydät täältä.

www.sucros.fi > Juurikkaanviljely > Viljelyohjeet > Lannoitus

www.sjt.fi > Viljelyohjeet > Ravinteet > Ravinnepuutokset