


Ajankohtaista juurikkaan kasvinsuojelussa 1/2026

Kylvöt ovat edenneet eri puolilla viljelyaluetta. Vapun lämpimät päivät ovat saaneet tuholaiset liikkeelle ja ensimmäiset kylvöt taimettumaan.

- Valtaosa siemenistä on peitattu Buteo+Force-peittauksella, jolloin saadaan tehoja niin maanalaisiin kuin maanpäälisiin tuholaisiin. Pohjavesialueella sallittu Force-peittaus suojaa vain maatuholaisia vastaan.
- Peittauksesta huolimatta **juurikaslohkojen tarkkailu tuholaiden varalta on tärkeää**. Liima-ansojen avulla voit seurata kirppapainetta jo ennen taimettumista. (Kuvassa kelta-ansan oikeassa reunassa on pisaranmuotoinen juurikaskirppa.)
 - **Liima-ansan käyttö:** Leikkaa isot ansat kolmeen osaan ja kiinnitä tukevasti maahan n. 10 m päähän pellonreunasta. Voit ruiskuttaa liima-ansojen ylitse, se ei vaikuta ansan tehoon.
- Taimettumisen jälkeen siirry tarkkailemaan syöntijälkiä taimissa.
 - **Juurikaskirppa:** Torjuntakynnys ylittyy, jos 20 satunnaisesta taimesta 3 tai useammassa näkyy useampia syöntijälkiä sirkkalehdissä.
 - **Peltolude:** Torjuntakynnys ylittyy, jos havaitset luteita pellolla tai liima-ansasta löytyy 2 yksilöä tai enemmän.
- Seuraa tilannetta Tuholaisten seuranta -sovelluksesta (AgriPortal mobile -sovellus tai sucros.fi).
 - Muista ottaa kuvakaappaus puhelimesi ruudun karttanäkymästä todentaaksesi sovelluksen käyttö tukivalvonnassa (Ympäristökorvauksen toimenpide). Lue lisää sovelluksen käytöstä [täältä](#).



Tuholaisten kuvat ja torjuntakynnykset löydät [täältä](#).

www.sucros.fi > Juurikkaanviljely > Viljelyohjeet > Kasvinsuojelu

www.sjt.fi > Viljelyohjeet > Kasvinsuojelu > Tuhohyönteiset

Rikkakasvientorjunta

- Perinteisellä viljelymenetelmällä ensimmäinen rikkatorjunta tulee ajankohtaiseksi rikkakasvien ollessa sirkkalehtivaiheessa. Yleensä noin 10-14 päivän kuluttua kylvöstä. Aikaisin kylväneillä ensimmäinen ruiskutus on ajankohtainen jo tällä viikolla.
 - Perinteinen ohjelma on taulukossa 1 merkitty sinisellä. Lisäksi tankkiseokseen voidaan tarvittaessa sekoittaa Centium tai Tanaris. Centium soveltuu erityisesti tatarten, mataran ja linnunkaalin torjuntaan, Tanaris saunakukan ja mataran torjuntaan. Huomioi molempien valmisteiden käytönrajoitukset.
- Hallan uhatessa tai pakkasten jälkeen, anna kasvien toipua stressistä vähintään päivä ennen rikkakasviruiskutusta tuleva sää huomioiden.
- ConvisoOne-ruiskutus on ajankohtainen vasta, kun savikassa on neljä kasvulehteä.

Taulukko 1. Perinteisen menetelmän rikkakasvientorjuntaohjelmat eri maalajeille.

	Savimaat (l/ha)	Kevyet kivennäismaat (l/ha)
Goltix 700 SC / Target SC	1,0	0,8–1,0
Betanal SE / Betasana 2000	1,5–2,0	1,0–1,5
Tramat 500 SC	0,3–0,4	0,2–0,3
Renol- / Sunoco-öljy	0,4–0,6 / 0,8–1,2*	0,4–0,6 / 0,8–1,2*
Centium 36 CS	0,05**	0,05**
Tanaris	(0,3) 0,6***	(0,3) 0,6***

*Sunoco-kiinniteöljyn käyttömäärä on 0,8–1,2 l/ha ja Renol-kiinniteöljyn käyttömäärä on puolet siitä eli 0,4–0,6 l/ha.

Centiumia ei saa laittaa ensimmäiseen tankkiseokseen. Saa käyttää samalla kasvulohkolla **vain joka kolmas vuosi.

*** **Tanaris:** ensimmäiseen tankkiseokseen 0,3 l/ha, muut käsittelyt 0,6 l/ha. **Pohjavesirajoitus,** saa käyttää **vain joka toinen vuosi** samalla kasvulohkolla.

Rikkakasvientorjuntaohjeet eri viljelymenetelmille ja lisätiedot löydät [täältä](#).

www.sucros.fi > Juurikkaanviljely > Viljelyohjeet > Kasvinsuojelu

www.sjt.fi > Viljelyohjeet > Kasvinsuojelu > Rikkakasvit